



À propos de l'auto-injecteur EpiPen® (épinéphrine)

L'épinéphrine est reconnue par les professionnels de la santé comme constituant le traitement d'urgence définitif pour les réactions allergiques graves. EpiPen est un auto-injecteur destiné à l'administration d'épinéphrine. Les auto-injecteurs EpiPen (épinéphrine) servent à traiter l'anaphylaxie depuis plus de 25 ans.

Prescrivez EpiPen aux patients présentant un risque d'anaphylaxie plus élevé[5]

- Les personnes ayant déjà eu des réactions allergiques anaphylactiques
- Les personnes atteintes d'asthme concomitant
- Les enfants atteints d'allergies alimentaires
- Les enfants atteints de maladies atopiques telles que l'eczéma
- Les enfants dont les parents souffrent d'allergies

Les patients peuvent aider à minimiser les risques associés à l'anaphylaxie :

- En portant EpiPen sur eux en tout temps
- En utilisant EpiPen dès le premier signe d'une réaction

Aidez vos patients à se protéger où qu'ils aillent

Vos patients doivent avoir EpiPen à portée de la main dans tous les lieux clés :



Inscrivez-vous pour recevoir des bulletins d'information

Nous travaillons actuellement à mettre à jour ce site afin de vous fournir des renseignements supplémentaires au sujet des réactions allergiques graves et d'EpiPen®.

Veuillez vous inscrire ici afin que nous puissions vous aviser lorsque ces mises à jour seront terminées.

Adresse de courriel

Inscrivez-vous dès maintenant



Les auto-injecteurs EpiPen sont faciles à utiliser*

L'étiquette fournit un mode d'emploi simple et rapide, facile à comprendre pour le patient
L'étui de transport incorpore un dispositif de protection de l'aiguille pour une sécurité accrue

Comment s'utilisent les auto-injecteurs EpiPen and EpiPen Jr.

EpiPen peut être administré en deux étapes simples :



Vous trouverez ci-dessous des instructions plus détaillées pour l'utilisation d'EpiPen :



1. Retirez le bouchon jaune ou vert du tube de rangement

Prenez l'auto-injecteur, l'embout noir vers le bas
Enlevez le bouchon de sécurité gris



2. Posez le bout noir contre l'extérieur de la cuisse et enfoncez-le fermement jusqu'à l'activation de l'auto-injecteur. Tenez-le en place pendant plusieurs secondes, puis enlevez-le

Massez la zone de l'injection pendant 10 secondes

Ayez immédiatement recours aux soins d'un médecin.

Les patients doivent composer le 911 ou demander à quelqu'un de les emmener à la salle d'urgence.

Dosages d'EpiPen

Deux dosages sont disponibles : EpiPen (0,3 mg) et EpiPen Jr. (0,15 mg). EpiPen doit être utilisé pour les adultes et les enfants qui pèsent au moins 30 kg. EpiPen Jr. doit être utilisé pour les enfants dont le poids se situe entre 15 kg et 30 kg.

Renseignements importants relatifs à la sécurité

Les auto-injecteurs EpiPen sont indiqués pour le traitement d'urgence des réactions anaphylactiques ainsi que pour les patients qui, selon leur médecin, présentent des risques accrus d'anaphylaxie. Ils sont conçus pour une auto-administration immédiate pour le traitement d'urgence de réactions allergiques graves (de type I) associées aux aliments, aux piqûres et aux morsures d'insectes, aux médicaments, au latex, à d'autres allergènes, ainsi qu'à l'anaphylaxie idiopathique ou causée par l'exercice.

Il n'existe aucune contre-indication connue à l'utilisation d'épinéphrine en cas de réaction allergique potentiellement mortelle. L'utilisation d'épinéphrine doit être évitée chez les patients atteints de choc cardiogène, traumatique ou hémorragique, de dilatation cardiaque ou d'artériosclérose cérébrale. L'utilisation d'épinéphrine doit être évitée chez les patients ayant une atteinte cérébrale organique ou souffrant de glaucome à angle fermé. L'épinéphrine doit être administrée avec prudence aux personnes âgées ou atteintes d'hyperthyroïdie, aux femmes enceintes et aux personnes souffrant de maladies cardiovasculaires ou de diabète.

Les effets indésirables de l'épinéphrine comprennent anxiété passagère et modérée, sensations d'hyperstimulation, appréhension, tremblements, faiblesse, manque de stabilité, étourdissements, transpiration, augmentation de la fréquence cardiaque, sensation de battements cardiaques plus violents, palpitations, pâleur, nausées et vomissements, maux de tête ainsi que difficultés respiratoires.

Les auto-injecteurs EpiPen sont conçus pour servir uniquement à des fins de soutien thérapeutique d'urgence et non pas en tant que traitement de substitution ou de remplacement des soins médicaux ou hospitaliers ultérieurs; ils ne sont pas non plus conçus pour remplacer les thérapies d'hyposensibilisation au venin d'insecte.

Afin de vous assurer que vos patients comprennent la bonne technique d'injection pour EpiPen, veuillez **[cliquer ici](#)** pour regarder une vidéo animée montrant comment administrer EpiPen.

*Veuillez consulter les informations complètes de prescription pour des instructions détaillées sur le dosage et l'administration.



© King Pharmaceuticals
Canada Inc., 2008.
2915 Argenta Road, Suite 7
Mississauga, (Ontario) L5N 8G6
Sans frais : 1-877-EPIPEN1
(1-877-374-7361)
Téléphone : 905-812-9911
Télécopieur : 1-905-812-9916
EpiPen® est une marque enregistrée
par Mylan, Inc. licenciée
exclusivement à sa filiale détenue
à 100 %, Dey, L.P. localisée
à Napa, California, USA.



Accueil | À propos de l'anaphylaxie | Causes de l'anaphylaxie | Directives pour le traitement | À propos de EpiPen
Trousse de formation | Couverture du Programme des médicaments | Bulletins d'information par courriel
Informations de prescription | Communiquez avec nous | Juridique | Carte du site | Références